



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°16 du 26 juillet 2005 - 2 pages

Mildiou

Situation sanitaire

Les symptômes déjà répertoriés en jardins ou en parcelles sont, de nouveau, bien sporulants (feutrage blanc).

Les conditions climatiques des jours passés, associés à des défauts de protection phytosanitaire peuvent être à l'origine de symptômes de mildiou en parcelle.

Le coin des modèles

Les conditions favorables continuent à faire progresser le risque mildiou.

Selon le modèle Guntz-Divoux, une génération supplémentaire est enregistrée sur l'ensemble des postes, voire 2 sur certains postes (Ebouleau et Forté). Les sorties de taches théoriques vont s'échelonner durant toute la semaine.

Les potentiels de sporulation sont encore élevés.

Préconisations

Il est conseillé d'observer vos parcelles.

➤ Toutes variétés confondues :

Prévision d'une semaine instable par Météo France.

La protection doit être assurée dans toutes les situations.

✓ **Sur variétés sensibles et intermédiaires : en raison du nombre de contaminations enregistrées et des potentiels de sporulation élevés, on privilégiera des spécialités possédant une action anti-sporulante.**

✓ **Sur variétés résistantes : la protection peut se poursuivre avec des contacts simples. En cas de mildiou déclaré en parcelle, reportez-vous au bulletin n°13 du 4 juillet 2005.**

Situation épidémiologique poste par poste
(d'après Guntz-Divoux et Milsol)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache
Amiens	11 ème	à partir du 31 juillet
Attilly	11 ème	à partir du 28 juillet
Beines	9 ème	à partir du 31 juillet
Bernaville (M F)	11 ème	à partir du 27 juillet
Ebouleau	9-10 ème	à partir du 25 juillet
Epehy (M F)	11 ème	à partir du 29 juillet
Forté	9-10 ème	à partir du 25 juillet
Froidmont		
Abbeville	11 ème	à partir du 31 juillet
Marcelcave	11 ème	à partir du 27 juillet
Saint Just en Chaussée	11 ème	à partir du 31 juillet
Vauvillers	10 ème	à partir du 27 juillet
Verdilly	11 ème	à partir du 26 juillet
Vic sur Aisne	8 ème	à partir du 26 juillet
Villeroy	10 ème	à partir du 31 juillet
Villers Bocage	12 ème	à partir du 27 juillet
Villiers le Sec	11 ème	à partir du 31 juillet
Vron (M F)	10 ème	à partir du 26 juillet

Ministère
de l'Agriculture
Service Régional de la
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3

Tél : 03 22 33 55 97
Fax : 03 22 33 55 56
E-mail : srpv.draf-
picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-
picardie.com

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Picardie par
délégation (art. L252-1 à
L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.A.P. n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier : 62 €
Tarif Fax : 59 €
Tarif E-mail : 57 €

Mildiou:
maintien des
risques

Pucerons :
diminution
des
populations

Stratégie
mildiou et
défanage :
rappels

BnF
S&T

P125

Pucerons

Situation

Les captures en cuvette sont en nette diminution. Même constat pour les populations en parcelle.

Attention, un grand nombre de larves de coccinelles est observé depuis ces derniers jours. La diminution du nombre de pucerons associée à la présence de ces prédateurs peut suffire à réguler les populations.

Préconisations

Rappels du seuil d'intervention :

plus de 20 folioles porteuses de pucerons sur les 40 observées.

Doryphores

Situation

La présence de doryphores est toujours constatée.

Préconisations

Dans le cas de présence mixte (pucerons et doryphores), privilégiez l'emploi d'un insecticide polyvalent.

Stratégie mildiou et défanage

Rappels

✓ La protection fongicide **avant et après le défanage** est particulièrement importante pour obtenir des tubercules sains.

✓ Il est nécessaire de maintenir la protection fongicide jusqu'à la destruction complète de la végétation.